

СОГЛАСОВАНО
Россельхознадзором
23 ноября 2017 г

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей
для регуляции половой охоты у котов и кобелей

(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей
(ContrSex Neo guttae pro cattorum et canum masculorum).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: бутират мепрегенола, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 мл содержат: ацетобумедон (бутират мепрегенола) – 5,0 мг и этинилэстрадиол – 0,2 мг, в качестве вспомогательного вещества соевое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей выпускают расфасованными по 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мл во флаконы полиэтиленовые с насадками-дозаторами. Флакон полиэтиленовый укупоривают навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и поштучно упаковывают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo[®] капли для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. КонтрСекс Нео® капли для кошек и собак – бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – ацетобумедон и эстроген – этинилэстрадиол.

Ацетобумедон блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин, который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулолестимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за секрецию тестостерона, угнетение половых рефлексов и сперматогенез.

Этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает успокаивающий эффект.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Нео® капли для кошек и собак по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат КонтрСекс Нео® капли для кошек и собак применяют:

- кошкам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории, а также для поддержания успокаивающего эффекта;
- собакам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения.

12. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при заболеваниях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов.

13. Лекарственный препарат вводят перорально, капая на корень языка, на нос или в корм. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории	До 5 кг 5,1-10 кг	4 капли 4-8 капель	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Молодым кошкам в первый день курса назначают 8 капель, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день.
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли	Регулярно 1 раз в 10-14 дней	1. Начало приема - в период полового покоя. 2. Может проводиться без перерывов.

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Примечания
Кобели	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения	до 5 кг 5,1-10 кг 10,1-30 кг свыше 30 кг	2 капли 2-4 капли 4-12 капель 12+2 капли на каждые последующие 5 кг массы тела	2 раза в день, с интервалом 12 ч в течение 5-7 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную дозу одновременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день.

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей до достижения животными половозрелого возраста запрещено.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время применения лекарственного препарата не разрешается пить, курить и принимать пищу, по окончании следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1. ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата КонтрСекс Нео® капли для котов и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 3 декабря 2015 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-11.15-3934№ПВР-3-6.0/02600