

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Деликс спрей инсектоакарицидный  
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «Бионикс», Санкт-Петербург, Ириновский проспект,  
д. 23, к. 1, пар. 5а)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Деликс спрей инсектоакарицидный (Delix spray insectoacaricidae).

Международное непатентованное наименование действующего вещества: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Деликс спрей инсектоакарицидный в качестве действующего вещества содержит синтетический пиретроид перметрин – 0,3%, а в качестве вспомогательных веществ глицерин и спирт изопропиловый.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Деликс спрей инсектоакарицидный хранится в течение срока годности при закрытом колпачке. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Деликс спрей инсектоакарицидный расфасованным по 150мл и 200 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости с механической распылительной головкой. Каждую потребительскую упаковку препарата сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят Деликс спрей инсектоакарицидный в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С.

6. Деликс спрей инсектоакарицидный следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Деликс спрей инсектоакарицидный относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам группы синтетических пиретроидов.

10. Перметрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и акарицидным действием, активен в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития вшей, блох, власоедов, иксодовых и саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. После опрыскивания животного, перметрин постепенно распределяется по всей поверхности тела, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движения, паралич и гибель эктопаразитов.

Деликс спрей инсектоакарицидный по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и sensibilizing действия, при попадании в глаза вызывает раздражение. Препарат токсичен для рыб и пчел.

## III. Порядок применения

11. Деликс спрей инсектоакарицидный применяют для обработки собак и кошек при энтомозах, саркоптозе, нотоэдрозе и поражении иксодовыми клещами.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не подлежат обработке беременные, кормящие самки, ослабленные, истощенные, больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, а также щенки и котята моложе 8-недельного возраста.

13. Обработку животных проводят на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания Деликс спрея инсектоакарицидного животному надевают намордник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы. Держа флакон с препаратом вертикально, нажимают на распылительную головку и направляют факел аэрозоля на поверхность тела с расстояния 10 – 20 см.

Для уничтожения насекомых и профилактики нападения на животных иксодовых клещей, препаратом обрабатывают все туловище животных против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и шею.

Доза Деликс спрея инсектоакарицидного зависит от массы животного, состояния шерстного покрова, степени инвазии и составляет от 3 до 6 мл на животное, что достигается соответственно 6 или 12 нажатиями на распылительную головку флакона.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного Деликс спрей инсектоакарицидный наносят на клеща и место его прикрепления к коже (одно нажатие на распылительную головку). Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают пинцетом из тела и уничтожают.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 10 дней.

В целях предотвращения повторной инвазии эктопаразитами подстилки, попоны и другие предметы ухода за животными обрабатывают препаратом из расчета 2 мл (4 нажатия на распылительную головку) на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

В течение трех дней не допускают контакта животного с обрабатываемыми предметами, а перед последующим использованием их стирают (моют) с моющим средством.

При поражении кошек нотоэдрозом, а собак саркоптозом Деликс спрей инсектоакарицидный наносят на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см.

Обработку проводят три – пять раз с интервалом 7 – 10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждается двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 1 день, нанося препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой половины тела.

До полного высыхания шерсти после обработки не следует позволять животным облизывать шерсть, допускать их к открытому огню и нагревательным приборам.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Препарат не следует применять беременным, кормящим самкам, щенкам и котятм моложе 2-х месячного возраста, а также собакам массой менее 2кг.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках, так как это может привести к снижению эффективности.

18. При применении Деликс спрея инсектоакарицидного в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций, препарат смывают водой с мылом, при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию и обращаются к ветеринарному специалисту.

19. Деликс спрей инсектоакарицидный не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами.

20. Деликс спрей инсектоакарицидный не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Деликс спреем инсектоакарицидным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить животное и допускать его к маленьким детям в течение 2 суток после обработки.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с

Деликс спреем инсектоакарицидным. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Деликс спрей инсектоакарицидный, утвержденную Россельхознадзором 28 декабря 2012 года.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного препарата  
для ветеринарного применения:

АО «Топ-Вет»,  
192171, Санкт-Петербург,  
Железнодорожный проспект, д. 20,  
литер "А".

Наименование и адрес организации,  
уполномоченной держателем  
или владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного препарата  
на принятие претензий от потребителя:

ООО «Бионикс»,  
195279, Санкт-Петербург,  
Ириновский проспект, д. 23, к.1, пар. 5а

Номер регистрационного удостоверения 76-3-20.12-3097 N ПБР-3-76/01897