

ДИРОНЕТ® джуниор

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата ДИРОНЕТ® джуниор

Согласовано Заместителем Руководителя Россельхознадзора Савенковым К.А.
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2).

I. Общие сведения

Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – ДИРОНЕТ® джуниор (DIRONET® junior);

международное непатентованное или группировочное наименование действующих веществ – пирантел, рибонуклеат натрия.

Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

ДИРОНЕТ® джуниор в качестве действующих веществ содержит: пирантела памоат – 15 мг/мл и рибонуклеат натрия – 0,5 мг/мл, а также вспомогательные вещества: сахарозу, твин-80, добавку со вкусом и ароматом мяса, нипагин, нипазол и воду очищенную.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию желтого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 3 месяца. Запрещается применять по истечении срока годности.

Выпускают ДИРОНЕТ® джуниор расфасованным по 15 и 20 мл в полимерные флаконы и флаконы из темного стекла, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Допускается снабжать флаконы полимерным адаптером для шприца-дозатора. Каждый флакон с препаратом индивидуально помещают в картонную пачку, снабжают шприц-дозатором и инструкцией по применению лекарственного препарата.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °C до 25 °C.

ДИРОНЕТ® джуниор следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

ДИРОНЕТ® джуниор относится к фармакотерапевтической группе: антигельминтные средства в комбинациях.

Входящий в состав препарата пирантела памоат – соединение группы пиримидинов, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, механизм его действия основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполаризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод. Пирантела памоат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизмененном виде (93%) с фекалиями в течение 24-48 часов.

Рибонуклеат натрия ускоряет процессы регенерации травмированных нематодами клеток кишечника животного, стимулирует иммунные процессы организма, активизирует иммунокомпетентные клетки (Т- и В-лимфоциты).

ДИРОНЕТ® джуниор по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится щенками и котятами всех пород.

III. Порядок применения

ДИРОНЕТ® джуниор назначают щенкам и котятам старше 3-недельного возраста, а также взрослым собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах: токсокарозе, токскардиозе, унцинариозе, анкилостомозе и трихоцефалезе.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам. При работе с препаратом ДИРОНЕТ® джуниор следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промывать большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ДИРОНЕТ® джуниор. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Препарат не предназначен для дегельминтизации беременных и лактирующих самок, а также щенков и котят моложе 3-недельного возраста.

ДИРОНЕТ® джуниор применяют щенкам, котят, а также взрослым собакам и кошкам индивидуально перорально (внутрь), однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма или с помощью шприца-дозатора в дозе 1 мл суспензии на 1 кг массы животного. Перед применением суспензию следует тщательно взболтать.

При дегельминтизации животных массой менее 0, 5 кг, перед применением с отмеренной дозе препарата добавляют 0,3 мл холодной кипяченой воды, тщательно встряхивают и вводят животному внутрь на корень языка.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям, с профилактической – ежеквартально в терапевтической дозе, а также за 7-10 дней перед каждой вакцинацией.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.


ДИРОНЕТ® джуниор не следует применять одновременно с другими антигельминтными препаратами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют по той же схеме.

ДИРОНЕТ® джуниор не предназначен для применения продуктивным животным.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.12-3620№ПВП-3-4.5/01569



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1. Телефон круглосуточной «горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный). Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.vetmag.ru