



Н.А. ВЛАСОВ

14.01.2020

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
СексКонтроль капли

(организация-разработчик: Neoterica GmbH / Неотерика ГмбХ  
Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-21.13-3797№ПВР-3-3.8/02127

**I. Общие сведения**

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: СексКонтроль капли (SexControl drops);  
международное непатентованное наименование: мегестрол.
2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.  
СексКонтроль капли в 1 мл содержат в качестве действующего вещества (ДВ) мегестрола ацетат – 25 мг, а в качестве вспомогательного вещества – полиэтиленгликоль-400.
3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость от белого до светло-желтого цвета.  
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.  
Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
4. Выпускают СексКонтроль капли расфасованными в полимерные флаконы-капельницы или в стеклянные флаконы по 3 или 5 мл, упакованные поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. СексКонтроль капли следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

**II. Фармакологические свойства**

9. СексКонтроль капли относятся к фармакологической группе: гормоны и их антагонисты.
10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген – мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки

предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 48 часов выводится из организма животного с мочой.

СексКонтроль капли по степени воздействия на организм относятся к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсибилизирующего и гепатотоксического действия.

### III. Порядок применения

11. СексКонтроль капли назначают кошкам и сукам для задержки и прерывания течки; котам и кобелям – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Не допускается применения СексКонтроль капель при заболеваниях мочеполовой системы, опухолях, диабете.

13. При работе с СексКонтроль каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с СексКонтроль каплями. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не допускается применения СексКонтроль капель неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.

15. СексКонтроль капли вводят животным перорально за 1 – 2 часа до кормления, закапывая в рот, нанося на кончик носа или на кусочек лакомства. Доза препарата зависит от вида, пола, массы животного и цели его применения. Перед каждым применением флакон с лекарственным препаратом СексКонтроль капли необходимо тщательно встряхнуть.

Кошкам СексКонтроль капли применяют:

– для задержки течки в период между течками в дозе 0,1 мл – 3 капли (2,5 мг ДВ) на животное один раз в неделю или 0,2 мл – 5 капель (5 мг ДВ) на животное один раз в 2 недели. Курс применения не более 18 месяцев, повторение курса возможно после проявления нормального физиологического цикла;

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 2 дня от ее начала в дозе 0,2 мл – 5 капель (5 мг ДВ) на животное в течение 4 – 7 дней (до исчезновения признаков течки плюс один день) с интервалом 24 часа.

Сукам СексКонтроль капли применяют:

– для задержки течки за 7 – 15 дней до ее начала ежедневно в дозе 0,1 мл (3 капли) на каждые 5 кг массы тела животного (0,5 мг/кг массы по ДВ);

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 2 дня от начала течки. Первые трое суток препарат применяют в дозе 0,4 мл (11 капель) на каждые 5 кг массы тела животного (2 мг/кг массы по ДВ), следующие семь суток – в дозе 0,2 мл (5 капель) на каждые 5 кг массы животного (1 мг/кг массы по ДВ).

В течение года сукам рекомендуется назначать не более двух курсов применения препарата.

Самцам препарат применяют для снижения полового возбуждения и коррекции поведения в следующих суточных дозах в течение первых 7 дней: котам – 0,2 мл – 5 капель (5 мг ДВ) на животное, кобелям – 0,4 мл (11 капель) на каждые 5 кг массы тела животного (2 мг/кг массы по ДВ); в последующие 14 дней – суточную дозу снижают в два раза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении СексКонтроля капли в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При длительном применении СексКонтроль капли или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению СексКонтроль капель, согласованная Россельхознадзором 18.07.2017 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263

Генеральный директор  
Neoterica GmbH, Германия

NEOTERICA GmbH  
Grillostraße 141  
Essen, Germany



В.В. Тарабрин